n.° 14.bis

Mr Bourguet Bachelier en Medecine a Montpellier a envoyé a Lacadémie quatre observations dont elle Ma charge de luy rendre compte. Le Sujet de la premiere est une nécrose dune partie de la Branche gauche de la Machoire inferieure à la Suitte de lextraction Successif de deux dents molaires du Mesme côté. La Malade Nayant point Etée traitée Methodiquement des abcès et de la carie Survenue depuis onze ans, la partie alveolaire Sest detachée en partie du corp de la machoire et de la Simphise, nayant plus dadherence qu'avec lapophise transverse de los temporal ~~du~~ ; lautheur en confie resonablement la chutte ala nature alaide ~~de~~ de gargarismes detersifs, et danti scorbutiques pris interieurement. La durée de cette Maladie et Sa description nadjoutte rien aux connoissances acquises sur cette matiere, puis quil est de fait que lon auroit pû guérir la malade dès les premiers tems en réunissant les moyens de lart tant internes qu'externes propres au genre de la maladie ./.

Necrose de la Machoire

La luxation de lextremité humerale de la clavicule compliquée de fracture de lomoplatte et prise pour une fracture de la partie Superieure de lhumerus+ fait le Sujet de la 2e observation. Mr Bourguet qui accompagnoit Mr son pere lorsquil fut mandé, dit quil Sapercut que lextremité humerale de la clavicule avoit Etée forcée par la violence du coup à quitter la facette articulaire du Bord anterieur de lacromion et que Se portant en ariere apres avoir rompu le ligament qui Sy fixe cette extremité à lapophise coracoide elle avoit glissée dans la fosse sous Scapulaire Brisée la partie Mince de los, penetrée dans la fosse Sus Epineuse et Setoit fait Sentir posterieurement, sous le trapese et les teguments ; un tel delabrement fut guerie Selon lautheur par la ~~simple~~ aplication dun Bandage en huit de chiffre fortifié du Spica apres des extentions methodiques, qui Ramenerent lextremité de la clavicule à Sa place ; on voit que lautheur Sest fait illusion dans la description de cette luxation, et quil Seroit impossible que la guérison Neut Etée traversée daccidents les plus graves et quelle Eut Succedée à la Simple aplication dun Bandage Si le desordre Eut Etée tel quil Se lest imaginé Mr Bourguet ~~[illegible]~~ pour suitte le peu dutilité que presente cette observation pour les progres de lart.

+ par le premier chirurgien qui fut appelé ;

Dans la troisieme observation ~~[illegible]~~ il est question de la paralisie et de la gangréne de lextremité Superieure aprés une fracture de la clavicule arivé à un jeune homme de 16 a 17 ans, le chirurgien qui fut mandé le premier croyant quindependamment de la fracture de la clavicule le col de lhumerus, Etoit aussy fracturé et luxé, apres plusieurs manoeuvres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 43 (a) n° 14

inconsiderée aplique un Bandage trop serré le sentiment qui etoit devenu moindre, à l'instant de la chutte se perdit tout à fait et fut aconpagné d'un gonflement considérable de toute l'extremité qui ceda d'abord au Relachement du Bandage et à l'aplication de quel ques resolutifs: ce fut au 54e jour que Mrs Bourquets pere et fils estants Mandés crurent voir que la portion humerale de la clavicule fracturée ayant passé sous la sternale avec laquelle elle etoit consolidée par le cal comprimoit une portion du pléxus brachial sans interesser l'artere et estoit selon ces Messieurs, la cause de l'accident grave qu'eprouvoit le Malade; ainsi des tailladez dans les endroits insensibles, des compresses im bibées de liqueur anti septique dont le bras fut envloppé avec un Ban dage à dix huit chefs fut ~~les~~ furent les moyens que l'on mit en usage reservant l'amputation pour derniere resource, au bout de trois jours il se ma nifesta des signes de supuration et au moment ou Mr Bourquet Ecrit il ignora quelle sera la terminaison de cette Maladie grave et craint que le malade n'en soit extropié je crois que sans recourir à la compression de l'extremité humerale de la clavicule et du col de la fracture sur le pléxus brachial les manœuvres inconsiderées et répetées pour la Réduction d'une fracture et d'une luxation qui n'existoient pas, la constriction d'un Bandage qui n'a pas eté deserré à tems doivent suffire pour causer les accidents cy dessus, que le malade sera des plus heureux de conserver ~~un~~ son bras quoi que gené dans ses mouvements tandis qu'il auroit pû en estre privé tout à fait: cette observation ne peut que completter les exemples malheureux de pareils evenements sans enrichir l'art en aucune maniere./.

Dans la quatrieme observation il est question d'une plaie faitte par un couteau qui fendit le poulce de la main depuis son extremité jus qu'a la teste de la 2e phalange un peu obliquement en suivant le bord radial, de maniere que le lambeau adherent etoit tres grelle l'auteur tantat la ~~reduction~~ reunion et parvint à l'aide d'un pansement Metho dique à procurer la guerison parfaitte en douze jours; la reussitte dans ces sortes de cas n'est pas rare et l'esperance du succès doit toujour estre la regle de la conduitte du chirurgien surtout dans les ~~[illegible]~~ premiers pansements. je viens de soigner un garcon charon qui s'etoit fendue le gros orteille d'un coup de hache jusqu'a son articulation avec l'os du Metatarse, en suivant les procedés qui menent à la reunion il a guerie dans un espace de tems triple de celuy de Mr Bourquet mais la premi ere phalange s'est exfoliée en deux partie; cette derniere observation ne presente pas plus d'utilitée que les trois precedentes ~~Messieurs~~ les étant toutes

~~ne peut tirer aucun avantage~~ le produit du zelle dun jeune home. qui entre nouvellement dans la cariere de la pratique et ne peuvent concourir en rien aux travaux de lacademie ./.

Coste 1er

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE